

SYMBOLS DESCRIPTION

	1. Catalogue number
	2. Use-by date
	3. Consult Instruction for Use
	4. Batch code
	5. Keep away from sunlight
	6. PAO: product must be used within 12 months after opening
	7. Temperature Storage Limitations: Low 15°C/59°F and High 25°C/77°F
	8. For proper disposal always follow local and national laws
	9. Responsible person for Europe

en - ENGLISH

PlakACT™ Gel

Gums Protection Gel – 0.2% Chlorhexidine
REF 8550 - 33 g tube
REF 8551 - 5 g tube

GENERAL INFORMATION

What is PlakACT

Excessive bacterial deposits generate an unhealthy oral environment that adversely affects the mucous membranes.

PlakACT line is indicated for the integration into a normal hygiene routine, by preventing bacterial deposits (plaque) on the surface of the teeth and mucous membranes, keeping them in good condition. PlakACT Gel can be applied to the entire dental arch by using the dispenser nozzle that allows precise distribution without dispersion of the gel.

PlakACT Gel is indicated for intensive anti-plaque action:

- before and after dental treatment including periodontal surgery;
- problems with periodontal and gingival tissues.

PlakACT is also recommended for the daily hygiene when removable prostheses or orthodontic appliances are used, which may lead to increased plaque accumulation and gums irritation, thus controlling the unpleasant odor sometimes caused by the devices themselves. PlakACT Gel is alcohol free and leaves a pleasant sensation of freshness in the mouth.

PRODUCT COMPOSITION

Ingredients: Aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, polysorbate 80, chlorhexidine digluconate, aroma, citric acid, aspartame, sodium hydroxide, (I1472).

INDICATIONS FOR USE

PlakACT products are intended to be integrated into a normal oral hygiene routine, to help prevent the formation of plaque.

CONTRAINDICATIONS

- PlakACT products are contraindicated in people with a known allergy to any of the product ingredients.

WARNINGS

- PlakACT Gel is to be used only for topical oral use.
- Do not mix PlakACT Gel with toothpaste, as it can be ineffective.
- PlakACT products are not recommended to be used continuously for more than 2 weeks.
- Do not swallow.
- Keep out of reach of children.
- In case of large ingestion of this product, immediately consult a doctor.

PRECAUTIONS

- During or in anticipation of a pregnancy, as well as during breastfeeding, consult your doctor prior to using this product.

UNDESIRABLE EFFECTS

Prolonged use of PlakACT products, may cause discoloration of the teeth, dentures or dental fillings. These are temporary and can be removed by brushing your teeth or by a professional tooth cleaning. Discoloration can be minimized by avoiding strong-coloring foods or beverages such as tea, coffee or red wine. If you experience any other side effects, consult your dentist.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. After carrying out your normal oral hygiene procedure with adequate rinsing, wait for at least 5 minutes before using PlakACT products.
 2. Apply PlakACT Gel directly on the affected area with the applicator nozzle.
 3. Leave the gel on for about 1-minute massaging slowly with your finger; any excess gel should be spit out after this exposure time.
 4. Do not rinse your mouth with water immediately afterwards.
 5. Use it 2 to 3 times a day.
 6. Do not use this product for more than 2 consecutive weeks.
- When used on removable prostheses or orthodontic appliances:
1. Remove and carefully clean the prosthesis or orthodontic appliance with a normal toothpaste.
 2. Rinse thoroughly with water.
 3. Before placing them back in the mouth, apply a layer of PlakACT Gel on the parts of the prostheses and orthodontic appliances that are in contact with the mucous membranes and teeth.
 4. Use it 2 to 3 times a day.

STORAGE AND DISPOSAL

Close container immediately after use to avoid moisture loss. Store in a dry place at a temperature of 15°C-25°C (59°F – 77°F). Keep away from sunlight. Refer to outer package for expiration date and Period-after-opening (PAO).

DISCLAIMER

The instructions provided above have been approved by Kerr Italia S.r.l. as being CAPABLE of preparing the product. Any deviation by the user from the instructions provided above will be done at your own risk; Kerr Italia S.r.l. will not be able to address any requests for refund or exchanges under guarantee of any products that have not been handled in accordance with the above instructions.

de - DEUTSCH

PlakACT™ Gel

Zahnfleischschutzgel – 0.2% Chlorhexidine
REF 8550 – 33-g-Tube
REF 8551 – 5-g-Tube

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Was ist PlakACT?

Übermäßige Bakterienablagerungen erzeugen ein ungesundes Umfeld im Mund, das die Schleimhäute beeinträchtigt. PlakACT-Produktlinie ist als Ergänzung der normalen Mundhygiene vorgesehen und verhindert die Anlagerung von Bakterien (Plaques) auf Zahnoberflächen und Schleimhäuten, wodurch diese gesund bleiben.

PlakACT-Gel kann über eine Spendendüse, die eine präzise Verteilung ohne Dispersion des Gels ermöglicht, auf den gesamten Zahnbogen aufgetragen werden.

PlakACT Gel ist auf die intensive Plaque-Bekämpfung ausgelegt, darunter:

- vor und nach zahnärztlichen Behandlungen, einschließlich parodontalen Eingriffen;
- bei Problemen mit parodontalem Gewebe und Zahnfleischgewebe.

PlakACT Gel wird zudem für die tägliche Hygiene empfohlen, wenn herausnehmbare Prothesen oder orthodontische Apparaturen verwendet werden. Diese können zu einer verstärkten Anlagerung von Plaque und Zahnfleischreizungen führen. Mit dem Gel lässt sich somit also das unangenehme Geruch dieser Apparaturen unter Kontrolle bringen.

PlakACT Gel ist alkoholfrei und hinterlässt ein angenehmes Frischgefühl im Mund.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Inhaltsstoffe: Aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, polysorbate 80, chlorhexidine digluconate, aroma, citric acid, aspartame, sodium hydroxide, (I1472).

INDIKATIONEN

PlakACT-Produktlinie ist als Ergänzung der normalen Mundhygiene vorgesehen und verhindert die Bildung von Plaque.

KONTRAINDIKATIONEN

- PlakACT-Produkte sind bei Patienten mit bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts kontraindiziert.

WARNHINWEISE

- PlakACT Gel ist nur zur topischen oralen Anwendung vorgesehen.
- PlakACT Gel nicht mit Zahnpasta mischen, da hierbei die Wirksamkeit beeinträchtigt werden kann.
- Es wird davon abgeraten, PlakACT-Produkte kontinuierlich mehr als 2 Wochen lang zu verwenden.
- Nicht schlucken.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Wurde versehentlich eine große Menge des Produkts verschluckt, unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der Anwendung des Produkts während oder in Erwartung einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit ärztlichen Rat einholen.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Eine längere Anwendung von PlakACT-Produkten kann zur Verfärbung von Zähnen, Zahnprothesen oder Zahnfüllungen führen. Diese ist vorübergehend und kann durch Zahnpulver oder eine professionelle Zahnreinigung behoben werden. Die Verfärbung lässt sich durch Verzicht auf stark farbende Lebensmittel und Getränke wie Tee, Kaffee und Rotwein minimieren. Sollten anderweitige unerwünschte Wirkungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANWEISUNGEN

1. Warten Sie nach der normalen Mundhygiene mit angemessener Spülung mindestens 5 Minuten, bevor Sie PlakACT-Produkte verwenden.
 2. Tragen Sie das PlakACT Gel mit der Applikatordüse direkt auf den betroffenen Bereich auf.
 3. Lassen Sie das Gel etwa 1 Minute lang einwirken und massieren Sie es langsam mit dem Finger ein. Überschüssiges Gel sollten Sie nach dieser Einwirkzeit ausspucken.
 4. Spülen Sie den Mund nicht sofort mit Wasser aus.
 5. Verwenden Sie das Gel zwei- bis dreimal täglich.
 6. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 2 Wochen am Stück.
- Bei der Verwendung bei herausnehmbaren Prothesen oder orthodontischen Apparaturen:
1. Entnehmen Sie die Prothese oder Apparat und reinigen Sie sie gründlich mit normaler Zahnpasta.
 2. Spülen Sie gründlich mit Wasser.
 3. Bevor Sie die Prothese oder Apparat wieder einsetzen, tragen Sie eine Schicht PlakACT Gel auf die mit Schleimhäuten und Zähnen in Berührung kommenden Teile auf.
 4. Verwenden Sie das Gel zwei- bis dreimal täglich.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Schließen Sie das Behältnis sofort nach der Verwendung, um einen Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden. Trocken bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Siehe Verfallsdatum und Haltbarkeit nach dem Öffnen auf der Umverpackung.

HALTUNGSAUSSCHLUSS

Die oben angegebenen Anweisungen wurden von Kerr Italia S.r.l. als GEEIGNET zur Vorbereitung des Produkts genehmigt. Jegliche Abweichung des Benutzers von den oben genannten Anweisungen erfolgt auf eigene Gefahr; Kerr Italia S.r.l. kann keinen Anträgen auf Rückerstattung oder Umtausch im Rahmen der Garantie für Produkte stattgeben, die nicht gemäß den oben genannten Anweisungen verwendet wurden.

ZEICHENERKLÄRUNG

1 Bestellnummer 2. Verfallsdatum 3. Gebrauchsanweisung beachten 4. Chargenkenntung 5. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 6. Haltbarkeit nach dem Öffnen: Das Produkt muss innerhalb von 12 Monaten nach dem Öffnen aufgebraucht werden. 7. Lagertemperatur: mindestens 15 °C, höchstens 25 °C 8. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung immer die lokalen und nationalen Bestimmungen einhalten 9. Verantwortliche Person für Europa

fr - FRANÇAIS

Gel PlakACT™

Gel de protection des gencives – 0.2% Chlorhexidine
REF 8550 - tube de 33 g
REF 8551 - tube de 5 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Qu'est-ce que PlakACT ?

Des dépôts de bactéries excessifs génèrent un environnement oral malsain qui affecte de manière négative les membranes muqueuses.

La gamme PlakACT est indiquée pour une intégration dans une routine d'hygiène normale, en empêchant la formation de dépôts de bactéries (plaque dentaire) sur la surface des dents et des membranes muqueuses, et en les conservant en bon état.

Le gel PlakACT peut être appliqué sur l'ensemble de l'arcade dentaire en utilisant la buse de distribution qui permet une distribution précise sans dispersion du gel.

Le gel PlakACT est indiqué pour une action anti-plaques intensive :

- avant et après tout soin dentaire, y compris la chirurgie parodontale ;
- problèmes avec les tissus parodontaux et gingivaux.

Le gel PlakACT est également recommandé pour l'hygiène journalière lorsque des prothèses ou appareils orthodontiques amovibles sont utilisés, ce qui peut entraîner une accumulation de la plaque dentaire et l'irritation des gencives, pour contrôler de cette manière l'odeur désagréable provenant parfois des appareils eux-mêmes.

Le gel PlakACT est sans alcool et laisse une sensation agréable de fraîcheur dans la bouche.

COMPOSITION DU PRODUIT

Ingédients : Aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, polysorbate 80, chlorhexidine digluconate, aroma, citric acid, aspartame, sodium hydroxide, (I1472).

INDICATIONS D'UTILISATION

Les produits PlakACT sont conçus pour être intégrés dans une routine d'hygiène orale normale pour prévenir la formation de plaque dentaire.

CONTRE-INDICATIONS

- Les produits PlakACT sont contre-indiqués chez les patients ayant une allergie connue à l'un des ingrédients du produit.

AVERTISSEMENTS

- Le gel PlakACT doit être utilisé uniquement pour une utilisation orale topique.
- Ne pas mélanger le gel PlakACT avec du dentifrice car cela peut se révéler inefficace.
- Les produits PlakACT ne sont pas recommandés pour une utilisation continue de plus de 2 semaines.
- Ne pas avaler.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'une grande quantité de ce produit, consulter immédiatement un médecin.

PRECAUTIONS

- Pendant ou en anticipation d'une grossesse, ainsi que pendant l'allaitement, consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

L'utilisation prolongée des produits PlakACT peut provoquer une décoloration des dents, dentiers ou plombages dentaires. Celle-ci est temporaire et peut être éliminée en vous brossant les dents ou par un nettoyage dentaire professionnel. La décoloration peut être minimisée en évitant les aliments ou boissons avec un fort effet colorant, tels que le thé, le café ou le vin rouge. Si vous présentez d'autres effets secondaires, consultez votre dentiste.

INSTRUCTIONS D'ÊTRE PAR ÉTAPES

1. Après avoir effectué votre procédure d'hygiène orale normale avec un rinçage approprié, patienter pendant au moins 5 minutes avant d'utiliser les produits PlakACT.
 2. Appliquer le gel PlakACT directement sur la zone affectée avec la buse d'apporteur.
 3. Laisser le gel reposer pendant environ 1 minute en massant lentement la zone avec votre doigt ; tout excès de gel doit être craché après une durée d'exposition.
 4. Ne pas rincer votre bouche à l'eau tout de suite après.
 5. L'utiliser 2 à 3 fois par jour.
 6. Ne pas utiliser ce produit pendant plus de 2 semaines consécutives.
- En cas d'utilisation sur des prothèses ou appareils orthodontiques amovibles :
1. Retirer et nettoyer avec soin la prothèse ou l'appareil orthodontique avec un dentifrice normal.
 2. Rincer minutieusement à l'eau.
 3. Avant de les replacer dans la bouche, appliquer une couche de gel PlakACT sur les parties des prothèses et appareils orthodontiques qui sont en contact avec les membranes muqueuses et les dents.
 4. L'utiliser 2 à 3 fois par jour.

CONSERVATION ET MISE AU REBUT

Fermer immédiatement le contenant après utilisation pour éviter la perte d'humidité. Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Garder à l'abri de la lumière du soleil. Consulter l'emballage extérieur pour connaître la date d'expiration et la durée d'utilisation après ouverture.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Les instructions fournies ci-dessus ont été approuvées par Kerr Italia S.r.l. comme CAPABLES de préparer le produit. Tout écart de la part de l'utilisateur par rapport aux instructions fournies ci-dessus sera réalisé à vos risques et périls ; Kerr Italia S.r.l. ne pourra pas traiter les demandes de remboursement ou d'échange sous garantie d'un produit quelconque n'ayant pas été utilisé conformément aux instructions ci-dessus.

DESCRIPTION DES SYMBOLES

1. Numéro de catalogue 2. Date de péremption 3. Consulter le mode d'emploi 4. Code du lot 5. Tenir à l'écart 6. Durée d'utilisation après ouverture : le produit doit être utilisé dans les 12 mois suivant l'ouverture et l'exposition à la lumière du soleil 7. Limites de température pour la conservation : basse 15 °C/59 °F et haute 25 °C/77 °F 8. Pour une mise au rebut appropriée, toujours respecter les réglementations locales et nationales 9. Personne responsable pour l'Europe

es - ESPAÑOL

PlakACT™ Gel

Gel de protección de las encías – 0.2% Chlorhexidine
REF 8550 - tubo de 33 g
REF 8551 - tubo de 5 g

INFORMACIÓN GENERAL

Qué es PlakACT

Unos depósitos bacterianos excesivos generan un entorno oral poco saludable que afecta de forma negativa a las membranas de la boca.

La línea de productos PlakACT está indicada para su integración en una rutina de higiene habitual, ya que estos productos evitan que se formen depósitos bacterianos (placa) en la superficie de los dientes y las membranas mucosas, ayudando a mantenerlos en buen estado.

PlakACT Gel se puede aplicar a todo el arco dental mediante la boquilla dispensadora, la cual permite una distribución precisa sin que el gel se disperse.

PlakACT Gel está indicado para una acción antiplaca intensiva:

- antes y después de cualquier tratamiento dental, incluida la cirugía periodontal;
- problemas en los tejidos periodontales y gingivales.

PlakACT Gel también está recomendado para la higiene diaria si se usan prótesis o aparatos ortodónticos extraíbles, lo que puede producir un aumento de la acumulación de placa y de la irritación en las encías, y también sirve para controlar los olores desagradables que a veces producen los propios aparatos. PlakACT Gel no contiene alcohol y deja una sensación agradable de frescor en la boca.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingredientes: Aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, polysorbate 80, chlorhexidine digluconate, aroma, citric acid, aspartame, sodium hydroxide, (I1472).

INDICACIONES DE USO

Los productos PlakACT están indicados para su integración en una rutina de higiene habitual con el fin de ayudar a prevenir la formación de placa.

CONTRAINDICACIONES

- Los productos PlakACT están contraindicados en pacientes con alergia conocida a cualquiera de los ingredientes del producto.

ADVERTENCIAS

- PlakACT Gel solo debe emplearse para un uso oral tópico.
- No mezcle PlakACT Gel con la pasta de dientes, ya que puede perder su efectividad.
- No se recomienda el uso de los productos PlakACT de forma continuada durante más de 2 semanas.
- No lo ingiera.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión de una gran cantidad de este producto, consulte con un médico de inmediato.

PRECAUCIONES

- Durante el embarazo o si se espera que este se produzca, así como durante la lactancia, consulte con su médico antes de utilizar este producto.

EFFECTOS NO DESEADOS

El uso prolongado de los productos PlakACT puede provocar decoloración de los dientes, las dentaduras postizas o los empastes. Esta decoloración es temporal y se puede eliminar mediante el cepillado de los dientes o con una limpieza dental profesional. La decoloración se puede minimizar si se evita el consumo de alimentos o bebidas con alto efecto colorante, como el té, el café o el vino tinto. Si sufre cualquier otro efecto secundario, consulte con su dentista.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Tras realizar su procedimiento de higiene oral habitual con un enjuague adecuado, espere al menos 5 minutos antes de utilizar cualquier producto PlakACT.
 2. Aplique PlakACT Gel directamente sobre la zona afectada con la boquilla aplicadora.
 3. Deje el gel durante aproximadamente 1 minuto, masajeando lentamente con su dedo; cualquier exceso de gel debe escurrirse tras este tiempo de exposición.
 4. No se enjuague la boca con agua inmediatamente después.
 5. Úselo de 2 a 3 veces al día.
 6. No use este producto durante más de 2 semanas consecutivas.
- Si se usa en prótesis extraíbles o aparatos ortodónticos:
1. Retire la prótesis o el aparato ortodóntico y límpielo cuidadosamente con una pasta de dientes normal.
 2. Aclare con abundante agua.
 3. Antes de volver a colocárselo en la boca, aplique una capa de PlakACT Gel sobre las partes de la prótesis o el aparato ortodóntico que estén en contacto con las membranas mucosas y los dientes.
 4. Úselo de 2 a 3 veces al día.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Cierre el recipiente inmediatamente después de su uso para evitar la pérdida de humedad. Almacénese en un lugar seco a una temperatura de 15 °C-25 °C (59 °F-77 °F). Manténgase alejado de la luz solar. Consulte la fecha de caducidad en el envase exterior.

AVISO LEGAL

Las instrucciones proporcionadas anteriormente han sido aprobadas por Kerr Italia S.r.l. como APTAS para la preparación del producto. Si el usuario se desvía de cualquier modo de las instrucciones anteriores, será bajo su propio riesgo; Kerr Italia S.r.l. no tendrá en cuenta ninguna solicitud de devolución o cambio de acuerdo con la garantía de aquellos productos que no se hayan manipulado de acuerdo con las instrucciones anteriores.

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

1. Número de catálogo 2. Fecha de caducidad 3. Consulte las instrucciones de uso 4. Código de lote 5. Manténgase alejado de la luz solar 6. Caducidad tras apertura: El producto se debe utilizar en los 12 meses siguientes a su apertura 7. Limitaciones de temperatura de almacenamiento: mínima: 15 °C/59 °F máxima 25 °C/77 °F 8. Para su correcta eliminación, siga siempre las normativas locales y nacionales 9. Responsable en Europa

pt - PORTUGUÊS

Gel PlakACT™

Gel de proteção gengival – 0.2% chlorhexidine
REF 8550 – tubo de 33 g
REF 8551 – tubo de 5 g

INFORMAÇÕES GERAIS

O que é o PlakACT

Os depósitos bacterianos excessivos produzem um ambiente oral não saudável que afeta negativamente as membranas mucosas.

A linha PlakACT é indicada para integração numa rotina de higiene normal, prevenindo a formação de depósitos bacterianos (placa) na superfície dos dentes e nas membranas mucosas, assegurando um ambiente oral saudável.

O Gel PlakACT pode ser aplicado em todo o arco dentário através do bocal dispensador, que permite uma distribuição precisa sem dispersar o gel.

O Gel PlakACT é indicado para uma ação antiplaca intensiva:

- antes e após qualquer tratamento dentário, incluindo cirurgia periodontal;
 - problemas com tecidos periodontais e gengivais.
- O Gel PlakACT também é recomendado para a higiene diária quando são utilizados aparelhos ortodónticos ou próteses removíveis, os quais podem provocar um aumento da acumulação de placa e irritação das gengivas, controlando assim o odor desagradável provocado pelos próprios dispositivos. O Gel PlakACT não contém álcool e deixa uma sensação agradável de frescura na boca.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Ingredientes: Aqua, glycerin, hydroxyethylcellulose, polysorbate 80, chlorhexidine digluconate, aroma, citric acid, aspartame, sodium hydroxide, (I1472).

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os produtos PlakACT destinam-se à integração numa rotina de higiene oral normal, para ajudar a prevenir a formação de placa.

CONTRAINDICAÇÕES

- Os produtos PlakACT estão contraindicados para pessoas com alergia conhecida a qualquer um dos ingredientes do produto.

ADVERTÊNCIAS

- O Gel PlakACT destina-se apenas a uma aplicação oral tópica.
- Não misture o Gel PlakACT com pasta dentífrica, caso contrário, o produto será ineficaz.
- Recomenda-se que os produtos PlakACT não sejam utilizados de forma contínua durante mais de 2 semanas.
- Não engolir o produto.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Em caso de ingestão de uma grande quantidade deste produto, consulte imediatamente um médico.

PRECAUÇÕES

- Durante o antes de uma gravidez, assim como durante a amamentação, consulte o seu médico antes de utilizar o produto.

EFEITOS NOS DESEJÁVEIS

Uma utilização prolongada dos produtos PlakACT pode provocar uma descoloração dos dentes, dentaduras ou obturações dentárias. Esta descoloração é temporária e pode ser removida através da escovagem dos dentes ou de uma limpeza dentária profissional. A descoloração pode ser minimizada evitando alimentos muito corantes ou bebidas como chá, café ou vinho tinto. Se ocorrerem outros efeitos secundários, consulte o seu dentista.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

1. Após realizar os seus procedimentos de higiene oral normais através de uma lavagem adequada, aguarde, no mínimo, 5 minutos antes de utilizar os produtos PlakACT.
2. Aplique o Gel PlakACT diretamente na área afetada com o bocal de aplicação.
3. Deixe o gel atuar durante cerca de 1 minuto, massageando lentamente com o dedo; qualquer excesso de gel após este tempo de exposição.
4. Não lave a boca com água imediatamente após a exposição.
5. Utilize 2 a 3 vezes por dia.
6. Não utilize este produto durante mais de 2 semanas consecutivas.

©Kerr Italia S.r.l., 2020. All rights reserved.

Made in Switzerland

07.50170.46.1_Rev.00 2020-05

PlakACT™



Kerr Italia S.r.l

Via Passanti 332, 84018 Scafati (SA), Italy
+39 061 850 8311 | www.kerrdental.com

